

Liebe Patientin, lieber Patient!

Sie haben von Ihrem Arzt Budiair® verordnet bekommen. Eine genaue Anwendungsbeschreibung finden Sie auf der Rückseite.

Bitte entnehmen Sie weitere Informationen der in der Verpackung befindlichen Packungsbeilage.



Bitte bedenken Sie auch, dass die Behandlung mit diesem Präparat eine kontinuierliche Anwendung erfordert. Für einen optimalen Therapieerfolg ist es daher wichtig, sich an die verordnete Dosierung zu halten.

Um eine störungsfreie Funktion von Budiair® zu gewährleisten, sollte das Mundstück regelmäßig (mindestens 1-mal pro Woche, bei Bedarf auch öfter) gereinigt werden.

**Wir wünschen Ihnen einen guten
Behandlungserfolg!**

So reinigen Sie das Mundstück



1 Das Druckbehältnis und die Schutzkappe vom Standardapplikator entfernen.



2 Ablagerungen gründlich mit lauwarmem Wasser entfernen.




3 Anschließend das Mundstück gut abtrocknen.



4 Das Druckbehältnis erst wieder einsetzen und die Schutzkappe aufstecken, wenn das Mundstück vollständig trocken ist.

So inhalieren Sie richtig mit Budiair®



- 1 Entfernen Sie die Schutzkappe vom Mundstück.
- 2 Atmen Sie langsam und so tief wie möglich aus.
- 3 Halten Sie das Druckbehältnis, unabhängig von der Körperposition, in der inhaliert wird, mit dem **Behälterboden nach oben**. Halten Sie den Inhalator zwischen Daumen und Zeige- oder Mittelfinger. Platzieren Sie das Mundstück vorsichtig zwischen den Zähnen und umschließen Sie es mit den Lippen. Neigen Sie den Kopf leicht zurück.
- 4 Atmen Sie langsam und tief durch den Mund ein und drücken Sie gleichzeitig auf den oberen Teil des Inhalators, um einen Aerosolstoß freizusetzen.
- 5 Halten Sie den Atem so lange wie ohne Anstrengung möglich an und nehmen Sie anschließend den Inhalator aus dem Mund.
- 6 Langsam durch die Nase oder die fast geschlossenen Lippen (Lippenbremse) ausatmen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

Budair® 200 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung. Wirkstoff: Budesonid. **Arzneilich wirksamer Bestandteil:** 1 Sprühstoß zu 56 mg enthält 200 Mikrogramm Budesonid. Dies entspricht einer über das Mundstück abgegebenen Menge von 184 Mikrogramm Budesonid. **Sonstige Bestandteile:** Norfluran, Ethanol, Glycerol. **Anwendungsgebiete:** Dauerbehandlung des persistierenden Asthma bronchiale. Zur Verminderung der Häufigkeit und Schwere von Exazerbationen und des Abbaus des allgemeinen Gesundheitszustandes bei einer fortgeschrittenen chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), wenn das Ansprechen auf inhalative Glukokortikoide klinisch und/oder spirometrisch nachgewiesen werden konnte. Hinweis: Budair® ist nicht zur Behandlung des akuten Asthmaanfalls geeignet. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Budesonid oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Häufig: Irritationen des Mund- und Rachenraumes, Husten und Heiserkeit, oropharyngeale Candidiasis. Selten: Bronchospasmus, Exanthem, Urtikaria, Pruritus, Erythem, Angioödem und Kontaktdermatitis, Hypo- und Hyperkortizismus, Wachstumsverzögerung, Überempfindlichkeitsreaktionen, anaphylaktischer Schock, depressive Verstimmung, Ruhelosigkeit, Aggressivität, Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Psychosen, Nervosität, Verhaltensauffälligkeiten (insbesondere bei Kindern). Sehr selten: Katarakt, Glaukom, adrenale Suppression, Minderung der Knochendichte. Bei Gabe von hohen Dosen über lange Zeiträume sind adrenale Suppression, Verminderung der Knochendichte, Wachstumsverzögerungen bei Kindern und Jugendlichen sowie Katarakt und Glaukom möglich. **Verschreibungspflichtig.**

Stand: Januar 2009