

При астме и ХОБЛ*:
FOSTER® 100/6 дозированный аэрозоль

Правильная ингаляция шаг за шагом

Счетчик дозы:

В упаковке находится картридж с 2-кратным активным ингредиентом свободно в пластмассовом ингаляторе. Перед первым применением окно счетчика доз отображает значение «121». Для тестирования вставьте металлический баллончик в пластиковый ингалятор и нажимайте до первого распыления. После этого дозированный аэрозоль готов к применению и окно счетчика доз отображает значение «120».

Если отображается значение «20», закажите новый ингалятор у своего врача. Прекратите использование ингалятора, когда отображается значение «0», поскольку количество, присутствующее в контейнере, может оказаться недостаточным для полной дозы.

Очищение:

1 раз в неделю протирайте внешнюю и внутреннюю поверхность мундштука сухим кусочком ткани (не промывать водой!).

Срок годности:

На упаковке аэрозоля находится наклейка, на которой аптека отмечает дату продажи. Срок хранения после данной даты при нормальной комнатной температуре составляет 5 месяцев. Хранить препарат FOSTER® 100/6 при температуре не выше 25°С и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Дальнейшая информация содержится в инструкции по применению.

Дозировка при астме*	
<input type="checkbox"/> FOSTER® 100/6 ДОЗИРОВАННЫЙ АЭРОЗОЛЬ + ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЛЕКАРСТВА	<input type="checkbox"/> FOSTER® 100/6 ДОЗИРОВАННЫЙ АЭРОЗОЛЬ В КАЧЕСТВЕ БАЗИСНОЙ И СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (КОНЦЕПЦИЯ MART)
FOSTER® 100/6 ЕЖЕДНЕВНО (МАКС. 4 ИНГАЛЯЦИИ):	FOSTER® 100/6 дозированный аэрозоль ежедневно:
утром: <input type="checkbox"/> ингаляции	утром: 1 ингаляция
вечером: <input type="checkbox"/> ингаляции	вечером: 1 ингаляция
+ при необходимости**:	+ при необходимости**:
_____ (Препарат)	FOSTER® 100/6
макс. <input type="checkbox"/> ингаляций в день	макс.6 ингаляций в день
	Общее количество ингаляций в день: максимум 8

Дозировка при ХОБЛ*	
<input type="checkbox"/> FOSTER® 100/6 дозированный аэрозоль	
FOSTER® 100/6 дозированный аэрозоль ежедневно:	
утром: 2 ингаляции	вечером: 2 ингаляции



Правильная ингаляция шаг за шагом



1
Перед вдыханием проверьте счетчик доз, затем снимите защитный колпачок с мундштука и убедитесь, что мундштук не содержит инородных тел.



2
Сделайте медленный глубокий выдох – но не в ингалятор.



3
Держите ингалятор большим, указательным и средним пальцами. Возьмите мундштук в рот, плотно обхватив его губами, и слегка наклоните голову назад.



4
Нажмите на металлический баллончик до появления распыления, одновременно производя глубокий медленный вдох через рот.



5
Задержите дыхание на 5 – 10 секунд или насколько это возможно без усилий.



6
Сделайте медленный выдох через нос или неплотно сжатые губы. Без препятствия губ. Вставьте защитный колпачок и пере проверьте счетчик дозы, который производит обратный отчет при каждом распылении.

* Для пациентов старше 18 лет

** В случае необходимости = в случае внезапного ухудшения симптомов астмы (приступ), таких как учащенное дыхание, свистящее дыхание и кашель