

الاستنشاق الصحيح خطوة بخطوة

التنظيف:

امسح جهاز الاستنشاق مرة 1 في الأسبوع بقطعة قماش نظيفة (من دون ماء)

الصلاحية:

3 سنوات هي مدة صلاحية FOSTER® NEXThaler® 200/6
بعد فتح الكيس لأول مرة يمكن استخدام الدواء لمدة 6 أشهر.
لا تخزن «فoster نيكستالر 200/6» بعد فتح الكيس لدرجة حرارة تفوق 25 درجة مئوية.
لا تعرض البخاخ لمحيط به رطوبة أو مبلول.

تجد المعلومات الإضافية في نشرة الاستعمال داخل العبوة.

جرعتك

FOSTER® NEXThaler® 200/6

4 مرات استنشاق يوميا:

صباحا:

2 مرات استنشاق

مساء:

2 مرات استنشاق



إرشادات الاستعمال خاصة بـ "فoster نيكستالر 200/6"

120 افحص عداد الجرعات قبل الاستخدام. تدل الأعداد من "1" إلى "120" على وجود جرعات في نيكستالر.
قبل استعمال جهاز الاستنشاق، تأكد من أن الغطاء مغلق تماما.
مسك جهاز الاستنشاق في وضع عمودي بحكم. افتح الآن الغطاء كاملا. استنشق بعمق بقدر الإمكان. لا تتنفس
خلال هذه العملية داخل جهاز الاستنشاق.



ضع جهاز الاستنشاق في الفم، امسك قطعة الفم بالشفنتين بإحكام. انتبه خلال مسك جهاز الاستنشاق بأن لا
تغطي مكان دخول الهواء. استنشق بسحب سريع وعميق. سوف تسمع صوت "كليك". لا تهتم بذلك وواصل
الاستنشاق بعمق.
بعد ذلك، اسحب جهاز الاستنشاق من فمك وامسك الهواء خلال 5 إلى 10 ثوان، بطريقة غير مجهدة لك.
تنفس بعدها ببطء. لا تتنفس داخل جهاز الاستنشاق.



ضع جهاز الاستنشاق مجددا في وضعية عمودية وأغلق الغطاء تماما.
119 تأكد من أن عداد الجرعات يظهر الآن عددا أصغر من الجرعات المتبقية. إن لم يكن كذلك اتصل
ب طبيبك / أو طبيبتك من التأكد من تقنية الاستنشاق أو اطلب من الصيدلي فحص وضع الجهاز.



جهاز FOSTER® NEXThaler® 200 ميكروغم/ 6 ميكروغم في كل استنشاق، بودرة للاستنشاق. المكونات: تحتوي كل كمية 10 مغم من

البودرة القابلة للاستنشاق على 200 ميكروغرام من (Ph. Eur.) Beclometasondipropionate و 6 ميكروغم (Ph. Eur.) Formoterolfumarat-Dihydrate مكونات أخرى:

Magnesiumstearat (Ph. Eur.), α -Lactose-Monohydrat. **مجال الاستخدام:** للاستخدام المنتظم لدى مرضى الربو البالغين الذين يصعب عليهم التحكم التام في الربو لديهم عبر استنشاق كورتيكوستيرويد أو موسع قصبي قصير المفعول يتم استنشاقه حسب الحاجة، أو في حالات الربو التي تتفاعل بشكل جيد مع كورتيكوستيرويد أو مع الموسع القصبي طويل المفعول. **موانع الاستخدام:** حساسية بالغة تجاه أحد المكونات. لا يستخدم لدى الأطفال أو المراهقين ما دون الـ 18 عاماً. **الآثار الجانبية:** خطر التنجس القصبي التناقضي. ردود أفعال تحسسية مثل تحسس البشرة، والحك، والطفح الجلدي، وإحمرار الجلد، أو تورمه، أو تورم الغشاء المخاطي، لا سيما في العينين والوجه والشفاة والحلق. الإصابة بفطريات (في الفم، الحلق)، الصداع، البحة، التهاب الحلق، ارتفاع مستوى السكر والدهن في الدم، ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم، انخفاض مستوى الكورتيزول في البول أو الدم، صعوبة في التنفس، للإنفلوانزا، ارتعاش، ضيق في الصدر، تدهور في الربو، سعال، توتر عصبي، ارتفاع مستوى السكر والدهن في الدم، ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم، انخفاض مستوى الكورتيزول في البول أو الدم، صعوبة في التنفس، تعب، إحساس بالنعاس، رؤية ضبابية. أعراض جانبية لأدوية مماثلة: ارتفاع دقات القلب، ارتفاع الضغط أو انخفاضه، تغيير أو تدهور حاسة التذوق، آلام أو تشنجات في العضل، أرق، دوار، انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم، اضطراب في دقات القلب، حالات الخوف، اضطراب في النوم. آثار عامة عند استنشاق

كورتيكوستيرويد في جرعات كبيرة ولمدة طويلة: كبت القشرة الكظرية، انخفاض كثافة المعادن في العظام، تأخر النمو لدى الأطفال والمراهقين، غلوكوما، كاتاركت، زيادة سريعة في الوزن (لا سيما في الوجه والجزء الأعلى من الجسم)، تغيرات سلوكية. أكثر وروداً لدى الأطفال: مشاكل في النوم، اكتئاب أو إحساس بالقلق، ارتباك، توتر الأعصاب، اضطراب وسهولة التهيج. متوفر تحت الوصفة الطبية فقط. Chiesi GmbH, Hamburg تاريخ التحديث: سبتمبر 2018