

При астме\*: FOSTER® NEXThaler® 200/6

## Правильная ингаляция шаг за шагом

### Очищение:

1 раз в неделю протирайте внешнюю и внутреннюю поверхность мундштука сухой тканью (не промывать водой!).

### Срок годности:

Срок годности препарата FOSTER® NEXThaler® 200/6 составляет 3 года. После первого вскрытия мешка препарат можно использовать в течение 6 мес. После вскрытия пакета препарат FOSTER® NEXThaler® 200/6 хранить при температуре не выше 25° С и не подвергать ингалятор воздействию влаги.

Дальнейшая информация содержится в инструкции по применению.

### Дозировка

FOSTER® NEXThaler® 200/6

4 ингаляции ежедневно:

утром:  
2 ингаляции

вечером:  
2 ингаляции



## Показания к применению FOSTER® NEXThaler® 200/6

1



Вскрытие

120

Перед использованием проверьте счетчик. Значение между «1» и «120» указывает на наличие доз в NEXThaler®.

Перед использованием ингалятора убедитесь, что крышка полностью закрыта.

Крепко держите ингалятор в вертикальном положении. Затем полностью откройте крышку. Выдохните как можно глубже. Не дышите в ингалятор.

2



Ингаляция

Направляйте ингалятор в рот и плотно зажмите мундштук губами. Обратите внимание на то, чтобы не закрывать воздухозаборник, удерживая ингалятор. Вдохните быстро и глубоко. Вы услышите щелканье. Не обращайте на него внимания, продолжайте глубоко вдыхать.

Выньте ингалятор изо рта и задержите дыхание на 5 – 10 секунд или насколько это возможно без усилий.

Медленно выдохните. Не дышите в ингалятор.

3



Завершение

119

Верните ингалятор в вертикальное положение и полностью закройте крышку.

Проверьте, указывает ли счетчик на меньшую дозу. Если это не так, проконсультируйтесь с вашим врачом по вопросу оценки техники ингаляции и / или попросите фармацевта проверить состояние устройства.

**FOSTER® NEXThaler® 200 мкг/6 мкг на ингаляцию, порошок для ингаляций.**

**Дополнительно:** 10 мг порошка для ингаляций содержит 200 мкг беклометазона дипропионата и 6 мкг формотерола fumarата дигидрата. Вспомогательные вещества: альфа-лактозы моногидрат, стеарат магния. **Показания к применению:** регулярное лечение астмы у взрослых пациентов, симптомы заболевания которых недостаточно контролируются ингаляционными кортикостероидами и бронходилататорами короткого действия, применяемыми в случае необходимости, или пациентов, получающих эффективные поддерживающие дозы кортикостероидов и бронходилататоров длительного действия. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к одному из компонентов. Дети и подростки до 18 лет. **Побочные действия:** риск развития парадоксального бронхоспазма. Аллергические реакции: кожная аллергия, зуд, сыпь, покраснение, отеки кожи или слизистых оболочек, в особенности в области глаз, лица, губ и глотки. Микозы (рот, глотка), головные боли, осиплость голоса, фарингит, учащенное или замедленное сердцебиение, изменение ЭКГ, симптомы гриппа, дрожь, чувство сдавливания в грудной клетке, обострение астмы, кашель, нервозность, увеличение содержания глюкозы и липидов в крови, увеличение содержания калия в крови, снижение уровня кортизола в крови или моче, удушье, недомогание, чувство усталости, размытое зрение. **Побочные действия сопоставимых лекарственных средств:** сердцебиение, повышение или снижение артериального давления, изменение или нарушение вкусовых ощущений, миалгия, судороги, беспокойство, головокружение, гипокалиемия, нерегулярное сердцебиение, необоснованное чувство страха, нарушение сна. **Системные эффекты** длительного применения ингаляционных кортикостероидов в больших дозах: угнетение функции надпочечников, снижение минеральной плотности костной ткани, задержка роста у детей и подростков, глаукома, катаракта, быстрый набор веса (особенно в области лица и туловища), расстройство поведения. Чаще всего встречается у детей: нарушения сна, депрессии или чувство беспокойства, нервозность, перевозбужденность или раздражительность. **Препарат отпускается по рецепту.** Chiesi GmbH, Hamburg.



По состоянию на сентябрь 2018 г.