

Правильная ингаляция шаг за шагом

Очищение:

1 раз в неделю протирайте мундштук ингалятора сухой тканью (не промывать водой).

Срок годности:

Срок годности препарата FOSTER® NEXThaler® 100/6 составляет 3 года. После первого вскрытия мешка препарат можно использовать в течение 6 мес. После вскрытия хранить препарат FOSTER® NEXThaler® 100/6 при температуре не выше 25° С и не подвергать ингалятор воздействию влажных сред.

Дальнейшая информация содержится в инструкции по применению.

Ваша дозировка при астме

FOSTER® NEXThaler® 100/6 + другие необходимые лекарства

FOSTER® 100/6 ежедневно (макс. 4 ингаляции):

утром: ингаляции

вечером: ингаляции

+ при необходимости**:

_____ (Препарат)

FOSTER® NEXThaler® 100/6 в качестве базисной и симптоматической терапии (концепция MART)

Foster® 100/6 ежедневно:

утром: 1 ингаляция

вечером: 1 ингаляция

+ при необходимости**:

FOSTER® 100/6

макс. 6 ингаляций в день

Общее количество

ингаляций в день:


максимально 8

Дозировка при ХОБЛ

Foster® NEXThaler® 100/6 NEXThaler®

Foster® 100/6 ежедневно:

утром: 2 ингаляции вечером: 2 ингаляции



Показания к применению FOSTER® NEXThaler® 100/6

1



Вскрытие

120

Перед использованием проверьте счетчик доз. Значение между «1» и «120» указывает на наличие доз в NEXThaler®.

Перед использованием ингалятора убедитесь, что крышка полностью закрыта.

Крепко держите ингалятор в вертикальном положении (Вы должны услышать щелчок). Затем полностью откройте крышку. Выдохните как можно глубже. Не дышите в ингалятор.

2



Ингаляция

Направьте ингалятор в рот и плотно зажмите мундштук губами. Обратите внимание на то, чтобы не закрывать воздухозаборник, держа ингалятор. Вдохните быстро и глубоко. Вы услышите щелчок. Не обращайтесь на него внимания, продолжайте глубоко вдыхать.

Выньте ингалятор изо рта и задержите дыхание на 5 – 10 секунд или насколько это возможно без усилий.

Медленно выдохните. Не дышите в ингалятор.

3



Завершение

Верните ингалятор в вертикальное положение и полностью закройте крышку.

119

Проверьте, указывает ли счетчик доз на меньшую дозу. Если это не так, проконсультируйтесь с вашим врачом по вопросу оценки техники ингаляции и / или попросите фармацевта проверить состояние устройства. Если Вам требуется еще одна доза, повторите шаги 1–3.

FOSTER® NEXThaler® 100 микрограмм/6 микрограмм на дозу. Порошок для ингаляций.

Дополнительно: Каждая доза содержит 100 мкг беклометазона дипропионат (Европейская фармакопея) и 6 мкг формотерола фумарата дигидрат (Европейская фармакопея). Вспомогательные вещества: α -лактозы моногидрат, стеарат магния (Европейская фармакопея). **Показания к применению:** Регулярное лечение астмы у взрослых пациентов, симптомы заболевания которых недостаточно контролируются ингаляционными кортикостероидами и бронходилататорами короткого действия, применяемыми в случае необходимости, или пациентов, больных астмой, получающих эффективные поддерживающие дозы кортикостероидов и бронходилататоров длительного действия. Облегчение симптомов тяжелой хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у взрослых. **Противопоказания:** Повышенная чувствительность к одному из компонентов. Не применять детьми и подростками в возрасте до 18 лет. **Побочные действия:** риск возникновения парадоксального бронхоспазма. Аллергические реакции, такие как кожная аллергия, зуд, сыпь, покраснение, отеки кожи или слизистых оболочек, в особенности в области глаз, лица, губ и глотки; грибковые инфекции (рот, глотка), головные боли, осиплость голоса, фарингит, учащенное или замедленное сердцебиение, изменение ЭКГ, симптомы гриппа, дрожь, чувство сдавливания в грудной клетке, обострение астмы, кашель, нервозность, увеличение содержания глюкозы и липидов в крови, увеличение содержания калия в крови, снижение уровня кортизола в крови или моче, одышка, недомогание, чувство усталости, у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких с такими симптомами, как высокая температура или озноб, усиленное выделение мокроты, изменение цвета мокроты, усиление кашля или одышки, размытое зрение. **Побочные действия сопоставимых лекарственных средств:** сердцебиение, повышение или снижение артериального давления, изменение или нарушение вкусовых ощущений, мышечные боли и судороги, беспокойство, головокружение, гипокалиемия, нерегулярное сердцебиение, необоснованное чувство страха, нарушение сна; **Системные эффекты** при длительном применении ингаляционных кортикостероидов в больших дозах: угнетение функции надпочечников, снижение минеральной плотности ткани, задержка роста у детей и подростков, глаукома, катаракта, быстрый набор веса (в особенности в области лица и туловища), расстройство поведения. Чаще всего встречается у детей: нарушения сна, депрессии или чувство тревоги, беспокойство, нервозность, перевозбужденность или раздражительность. **Препарат отпускается по рецепту.** Chiesi GmbH, Hamburg.



По состоянию на июнь 2018 г.