

Severe Respiratory Insufficiency Questionnaire

SRI

Pasient spørreskjema om opplevelse av egen helse-
tilstand ved respirasjonssvikt

Vurdering

For å gjøre verdiene sammenlignbare oppgis svaralternativene i tall fra 1 til 5:

Stemmer ikke	=>	1
Stemmer nesten ikke	=>	2
Stemmer delvis	=>	3
Stemmer ganske bra	=>	4
Stemmer helt	=>	5

Deretter blir sifrene rekodet slik at de høyere sifrene skal samsvare med sin:

Råverdi		Rekodet verdi	
1	→	5	Punkter som skal rekodes : 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48;
2	→	4	
3	→	3	
4	→	2	
5	→	1	

I neste omgang blir skalaene beregnet. Middelveiene utregnes dersom minst halvparten av punktene er besvart. Ved hjelp av formlene nedenfor blir råverdiene omgjort til skalaverdier mellom 0 og 100.

Respiratory Complaints

$$SRI - RC = \frac{Mean [2,5,12,19,22,24,25,29] - 1}{4} \bullet 100$$

Physical Functioning

$$SRI - PF = \frac{Mean [1,16,32,33,41,45] - 1}{4} \bullet 100$$

Attendant Symptoms and Sleep

$$SRI - AS = \frac{Mean [6,9,11,14,17,18,42] - 1}{4} \bullet 100$$

Social Relationships

$$SRI - SR = \frac{Mean [7,10,21,27,43,46] - 1}{4} \bullet 100$$

Anxiety

$$SRI - AX = \frac{Mean [8,13,26,28,39] - 1}{4} \bullet 100$$

Psychological Well-Being

$$SRI - WB = \frac{Mean [4,20,30,34,36,38,40,44,49] - 1}{4} \bullet 100$$

Social Functioning

$$SRI - SF = \frac{Mean [3,15,23,31,35,37,47,48] - 1}{4} \bullet 100$$

Totalsummen (**SRI-SS** = sumskala) regnes ut etter skalaverdiens middelværdi (SRI-RC, SRI-PF, SRI-AS, SRI-SR, SRI-AX, SRI-WB, SRI-SF). Dersom verdiene i en skala mangler, skal beregningen utelates. I vurderingen tilsvarer høye verdier høy livskvalitet, mens lave verdier står for lav livskvalitet.